

**STUDI KELAYAKAN LAHAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT
(*Eucheuma Cottonii*)
DI KECAMATAN BLUTO SUMENEP MADURA JAWA TIMUR**

Doni Ferdiansyah
Staff Pengajar Fakultas Pertanian Universitas Islam Madura
doni.ferdiansyah@yahoo.com

ABSTRAK

*Budidaya rumput laut di Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mempunyai kontribusi bagi perekonomian masyarakat pesisir, akan tetapi terdapat kegiatan perikanan seperti penangkapan dan pengolahan hasil laut yang berdampak pada degradasi kualitas air yang berpengaruh langsung kepada hasil produksi rumput laut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lokasi baru pengembangan kegiatan budidaya rumput laut secara berkelanjutan yang terbebas dari kegiatan masyarakat dengan melihat faktor ekologis dan daya dukung perairan di Kecamatan Bluto. Metode yang digunakan mengukur kesesuaian ekologis meliputi suhu, kecerahan, kedalaman, kecepatan arus, kondisi dasar perairan, salinitas, DO, nitrat, ortofosfat, pH, BOD, dan COD, serta estimasi hama dan penyakit rumput laut. Selanjutnya data diskoring untuk menentukan kelas kesesuaian dengan pendekatan SIG. Daya dukung perairan di analisis dengan menghitung 60% dari jumlah kawasan yang sesuai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perairan Bluto memiliki potensi lahan pengembangan rumput laut berdasarkan kelas S1 (sangat sesuai) dan S2 (sesuai bersyarat) seluas 770,19 ha, dan mampu menampung maksimal 42.788 unit rakit rumput laut. Hama dan penyakit yang teridentifikasi di perairan Bluto adalah ikan baronang (*Siganus. sp*), ice-ice, lumut (*Chaetomorpha crassa*), dan teritip (*Chthamalus stellatus*).*

Kata Kunci : Faktor Ekologi, Kualitas Air, Rumput Laut.

ABSTRACT

Seaweed cultivation in the district Bluto, Sumenep, East Java, has contributed to the economy of coastal communities, but there are fishing activities such as fishing and seafood processing that affects the degradation of water quality directly affect the production of seaweed. The purpose of this study was to determine the new location of the development of seaweed farming activities in a sustainable manner that is free from community activities with the view of ecological factors and the carrying capacity of the waters in the district Bluto. The method used to measure the ecological suitability include temperature, brightness, depth, current speed, the basic conditions of the waters, salinity, DO, nitrate, orthophosphate, pH, BOD and COD, as well as estimates of pests and diseases seaweed. Furthermore, the data diskoring to determine the suitability classes with GIS approach. The carrying capacity of the waters in the analysis by calculating 60% of the amount of the corresponding region. The results showed that the waters Bluto has the potential development land seaweed based S1 class (very appropriate) and S2 (corresponding conditional) covering 770.19 ha, and is able to accommodate a maximum of 42 788 units seaweed rafts. Pests

and diseases are identified in the waters Bluto is baronang fish (Siganus. Sp), ice-ice, moss (Chaetomorpha crassa), and barnacles (Chthamalus stellatus).

Keywords: Ecological Factors, Water Quality, Seaweed.

PENDAHULUAN

Perikanan dan akuakultur menyediakan pangan yang besar dan pendapatan bagi negara- negara yang mempunyai pesisir dan merupakan sumber kehidupan dari 3 milyar orang (Amosu dan Alberto, 2012). Rumput laut merupakan tanaman yang mengagumkan dilaut dan merupakan tanaman yang sangat berguna. Rumput laut tumbuh di perairan dangkal (Mohammed, 2013). Rumput laut juga dapat dimanfaatkan sebagai penyerap nutrient yang berlebihan dari buangan tambak perikanan.

Kabupaten sumenep merupakan daerah penghasil rumput laut terbesar di Jawa Timur. Wilayah pantai yang landai, ekosistem terumbu karang dan perairan laut yang relatif tenang memacu perkembangan usaha budidaya rumput laut, dan dengan luas areal budidaya 5.795 ha dapat menghasilkan 3.224,70 ton rumput laut per tahun (Anonim, 2008).

Pengelolaan dan pengembangan di Kecamatan Bluto Sumenep untuk budidaya rumput laut telah menjadi agenda pemerintah. Pengelolaan dan pengembangan harus didasarkan kepada daya dukung lingkungannya dan kelayakan pemanfaatan lahannya untuk budidaya rumput laut. Hal ini disebabkan di daerah Bluto sangat rentan terhadap perubahan lingkungan sekelilingnya seperti kegiatan penangkapan dan pengolahan perikanan oleh masyarakat. Pengembangan yang dilakukan harus tetap dalam koridor daya dukung lingkungannya dan sesuai dengan kegunaan lahannya serta sesuai dengan keinginan masyarakatnya (Zoeraini, 1992). Pengembangan kawasan budidaya rumput laut belum teridentifikasi secara menyeluruh. Permasalahan rumput laut yang ada di Indonesia adalah belum adanya peta kawasan pengembangan tata ruang yang ditunjang daya dukung lingkungan, selain itu adanya kesenjangan informasi masyarakat utamanya informasi pasar, informasi teknologi, sumber bibit, hama dan penyakit, musim, perawatan, sampai pasca panen dan sumber permodalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lokasi pengembangan kegiatan budidaya rumput laut secara berkelanjutan dengan melihat faktor ekologis, daya dukung dan dampak dari masyarakat terhadap budidaya rumput laut di perairan Kecamatan Bluto.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September 2013. Pengambilan data meliputi data ekologi perairan, skoring, daya dukung lahan dan wawancara. Serta penggunaan software Arcgis untuk pembuatan kawasan yang sesuai dalam budidaya rumput laut secara ekologi perairan.

Tabel 1. Sistem Penilaian Kesesuaian Perairan Lokasi Budidaya Rumput Laut.

Variabel Sumber	Kisaran	Angka penilaian(A)	Bobot (B)	Skor (AxB)
Ortofosfat (mg/L)	0,2-0,5	5	3	15
	0,1 - 0,2 & 0,5 - 1	3		9
	<0,1 dan >1	1		3
Nitrat (mg/L)	0,9 - 3,2	5	3	15
	0,7 - 0,8 & 3,3 - 3,4	3		9
	<0,7 ; > 3,4	1		3
Kecepatan Arus (cm/det)	20 - 30	5	3	15
	10-20 dan 30 - 40	3		9
	< 10 dan > 40	1		3
Suhu (°C)	24 - 30	5	3	15
	20 - 24	3		9
	<20 dan >30	1		3
COD (mg/L)	10-90	5	3	15
	91-100	3		9
	>100	1		3
BOD (mg/L)	1-2	5	3	15
	3-5	3		9
	6-9	1		3
pH	6,5-8,5	5	2	10
	4 - 6,4 dan 8,5 - 9	3		6
	<4 dan >9,5	1		2
Salinitas (ppt)	22 - 34	5	2	10
	30 - 32	3		6
	< 30 dan > 34	1		2
Kedalaman (m)	1 - 10	5	2	10
	11-15	3		6
	< 1 dan >15	1		2
Kecerahan (m)	> 3	5	2	10
	1-3	3		6
	<1	1		2
DO (mg/L)	>6	5	2	10
	4-6	3		6
	<4	1		2

Keterangan :

1. Angka Penilaian berdasarkan petunjuk Anonim (2002) yaitu
5 : Baik
3 : Sedang
1 : Kurang
2. Bobot berdasarkan pertimbangan pengaruh variabel dominan.
3. Skor adalah $\Sigma = A \times B$
 $i=1$

Ekologi Perairan

Ekologi perairan diambil pada 15 titik lokasi perairan di sepanjang kecamatan Bluto, yang meliputi: suhu, kecerahan, kedalaman, kecepatan arus, kondisi dasar perairan, salinitas, DO, Nitrat, Ortofosfat, pH, BOD, dan COD, sedangkan hama dan penyakit diperoleh dengan visualisasi atau identifikasi langsung di lokasi. Parameter lingkungan selanjutnya di skoring untuk menentukan nilai kesesuaian lahan budidaya rumput laut, nilai skoring dapat dilihat pada Tabel 1.

Hasil evaluasi dari sistem penilaian kesesuaian lokasi bagi budidaya rumput laut diperlihatkan pada Tabel 2. Selanjutnya nilai yang diperoleh dijadikan input untuk pembuatan kawasan yang sesuai dengan menggunakan Arcgis 9.3.

Daya Dukung Lahan

Estimasi daya dukung lingkungan perairan akan menunjukkan berapa unit rakit yang boleh ditanam dalam luasan area yang telah ditentukan. Untuk menganalisis daya dukung lingkungan menggunakan pendekatan dari formulasi yang dikemukakan Souselisa (2006) dalam Amarullah (2007) di mana untuk menduga daya dukung lingkungan adalah membandingkan luas suatu kawasan yang digunakan dengan luasan unit metode budidaya rumput laut. perhitungan daya dukung lahan menggunakan rumus

Wawancara

Dampak budidaya terhadap lingkungan dan produksi perikanan budidaya telah menjadi isu penting dalam beberapa tahun terakhir (Phillips,1990). Aktivitas masyarakat pesisir berdampak negatif pada lingkungan sekitarnya, oleh sebab itu perlu diketahui aktivitas yang ada di lokasi yang dapat mengganggu kegiatan budidaya. Wawancara meliputi kegiatan perikanan dan pengolahan yang ada di lokasi serta konflik kepentingan. Selanjutnya dibuat peta lokasi yang sesuai untuk kegiatan budidaya rumput laut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran kualitas perairan diperoleh bahwa lokasi budidaya di perairan Bluto masih bagus pada beberapa titik koordinat, akan tetapi ada juga titik nilai yang menunjukkan skor kurang bagus. Hal ini diduga pada beberapa lokasi di perairan Bluto mempunyai tingkat pencemaran yang tinggi, sebagai contoh pada koordinat (113,8121, -7,1330 dan 113,8095, -7,1351). Hasil pengukuran parameter kualitas air yang dilakukan pada 15 titik.

Tabel 3. Hasil Pengukuran Kualitas Air.

koordinat x	koordinat Y	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	DO (mg/L)	Kecepatan arus cm/det	Kece- rahan (m)	Keda- lam- an (m)	Nitrat (mg/L)	PO4 (mg/L)	pH	Salinitas (‰)	Suhu (°C)	Skor (%)
113,8121	-7,1330	6,3	110	6,94	6,0	0,6	0,9	2,9	0,58	7,5	30	31,6	70
113,8095	-7,1351	5,4	114	7,24	6,4	1,3	1,7	3,5	0,49	7,5	30	31,5	72
113,8122	-7,1392	5,5	92	6,96	9,3	1,3	2,0	4,0	0,56	7,2	32	30,6	78
113,8087	-7,1416	5,1	94	6,92	11,7	1,5	2,7	4,2	0,45	7,2	31	30,1	90
113,8028	-7,1430	5,3	80	6,80	23,7	1,5	3,1	6,3	0,34	7,3	30	30,0	114
113,7699	-7,1247	2,5	50	6,74	7,2	0,6	1,0	2,2	0,29	7,2	33	31,4	112
113,7662	-7,1258	2,3	15	7,10	6,8	1,0	1,6	2,8	0,26	7,3	33	31,3	112
113,7680	-7,1276	2,0	18	7,06	13,0	1,2	1,9	3,0	0,17	8,0	32	31,9	102
113,7715	-7,1296	1,7	20	6,96	12,0	1,4	2,3	1,3	0,16	7,5	33	31,0	112
113,7750	-7,1321	1,3	25	7,08	22,1	1,3	3,3	1,1	0,11	7,7	34	30,4	118
113,7254	-7,1175	1,4	16	5,00	6,0	1,0	1,2	0,7	0,16	7,5	34	30,4	92
113,7286	-7,1206	3,0	40	7,06	12,0	1,3	2,2	0,7	0,21	7,3	31	30,8	96
113,7214	-7,1233	1,9	21	7,30	17,2	1,4	2,5	0,9	0,17	7,0	32	31,0	99
113,7275	-7,1250	1,2	17	6,00	22,8	1,3	2,7	0,1	0,21	6,9	32	30,8	104
113,7243	-7,1252	1,1	16	7,10	25,3	1,6	2,9	0,1	0,11	7,1	35	30,4	98

Ekologi Perairan

Nilai BOD di lokasi berkisar antara 1,1 – 6,3 mg/L, pada beberapa lokasi nilai BOD ditenggarai melebihi batas optimal 1-2 mg/L (Agustiningsih, 2012). Perbedaan nilai ini dikarenakan perairan. Bluto rentan akan masukan limbah baik dari rumah tangga, pabrik, dan pertanian. Lokasi budidaya rumput laut di harapkan jauh dari sumber pencemar karena akan membuat rumput laut menjadi kerdil, rumput laut akan dilapisi cairan yang berkilau seperti pelangi pada bagian *thallus* sehingga daya serap unsur hara terganggu.

COD merupakan ukuran bagi tingkat pencemaran di suatu wilayah oleh bahan organik. Nilai COD di Bluto berkisar 15-114 mg/L, nilai tersebut terlalu tinggi atau masuk kategori tercemar. Bluto termasuk daerah yang sebagian besar aktivitas penduduknya adalah perikanan tangkap, budidaya, pertanian, dan pengolahan hasil tangkapan skala rumah tangga dan pabrik yang sebagian besar limbahnya di buang langsung ke laut.

Seperti halnya tumbuhan lainnya, rumput laut membutuhkan oksigen untuk kegiatan fotosintesis. Oksigen terlarut di lokasi penelitian berkisar antara 5-7,24 mg/L. Nilai oksigen terlarut terendah berkisar <5 mg/L, sebab jika oksigen terlarut lebih rendah dari nilai tersebut dapat diindikasikan perairan tersebut mengalami gangguan kekurangan oksigen, hal tersebut terjadi akibat kenaikan suhu pada siang hari, malam hari akibat respirasi organisme air, juga disebabkan oleh adanya lapisan minyak di atas permukaan air dan masuknya limbah organik yang mudah larut (Kamlasi, 2008).

Arus mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan rumput laut. Jika arus terlalu pelan maka akan mengganggu penyerapan zat hara yang berada di perairan, selain itu arus yang pelan akan berdampak pada epifit-epifit yang tumbuh menempel pada rumput laut akan semakin banyak sehingga dapat menjadi kompetitor dalam mendapatkan nutrisi (Arisandi, 2012). Kecepatan arus di lokasi berkisar 6-25,3 cm/dtk, rekomendasi budidaya rumput laut sebaiknya >10 cm/detik. Di Bluto lokasi yang sesuai untuk budidaya rumput laut berjarak minimal 300 m dari bibir pantai karena arus yang lebih kencang.

Nilai kecerahan yang sesuai untuk pertumbuhan rumput laut menurut (Radiarta dkk, 2003) adalah >3 m. Kisaran nilai kecerahan di perairan Bluto adalah 0,6-1,6 m, parameter kecerahan dinilai kurang mendukung untuk kegiatan budidaya rumput laut. Substrat lumpur berpasir membuat tingkat kecerahan di lokasi rendah. Kedalaman laut di perairan Bluto antara 0,9-3,3 m, dapat diasumsikan bahwa perairan bluto termasuk perairan yang landai. Nilai tersebut masih dalam kisaran yang dapat ditolerir oleh pertumbuhan rumput laut.

Nitrat di lokasi penelitian diperoleh kisaran nilai 0,1-6,3 mg/L, nilai tersebut terbilang terlalu tinggi yang mengindikasikan bahwa perairan bluto subur. Kesuburan perairan untuk kegiatan budidaya harus pada kisaran optimal. Jika nitrat terlalu tinggi akan berdampak pada pertumbuhan rumput laut karena memunculkan alga-alga sebagai kompetitor dalam mendapatkan nutrisi.

Ortofosfat berkisar 0,1-0,58 mg/L. Nilai ini terbilang terlalu tinggi untuk suatu perairan. Sama halnya seperti nitrat keberadaan ortofosfat bersifat pembatas bagi pertumbuhan rumput laut, terkait dengan tingkat kesuburan perairan. Perairan Bluto terbilang subur dikarenakan terdapat banyak masukan bahan organik dari darat, pertanian, limbah RT dan pabrik juga peternakan. Nilai pH di perairan Bluto diperoleh kisaran 6,9-8. Nilai pH

tersebut masih dalam kisaran normal. Ukuran pH berpengaruh pada rendemen karaginan rumput laut. Menurut Harahap dkk (2011), pH 7,5-8,5 menunjukkan peningkatan rendemen karaginan dan menurun pada nilai pH 9.

Hasil pengukuran salinitas di lokasi berkisar antara 30-35 ppt dan nilai tersebut masih dalam batas normal. Nilai salinitas 30-35‰ dapat meningkatkan jumlah sel, pertumbuhan, dan rendemen karaginan rumput laut (Arisandi, 2011). Hasil pengukuran kualitas air diperoleh kisaran suhu di lokasi 29-33 °C yang tergantung musim. Saat musim kemarau nilai suhu dapat mencapai 34°C. Nilai suhu tersebut masih dalam batas normal yang bisa ditoleransi oleh rumput laut. Teknik budidaya yang tepat menjadi faktor pembatas dalam peningkatan produksi, umumnya di Bluto menggunakan rakit apung yang sebagian *thallus* rumput laut muncul ke permukaan sehingga terpapar langsung oleh sinar matahari yang mengakibatkan *thallus* menjadi pucat dikarenakan ketinggian nilai suhu permukaan laut. Selanjutnya rumput laut yang pucat akan mudah putus hanyut terbawa arus.

Hama dan Penyakit

Hasil pengamatan hama dan penyakit diidentifikasi Teritip (*Chthamalus stellatus*), Ikan Baronang (*Siganus sp.*), Ice-ice, dan Lumut (*Chaetomorpha crassa*). Masalah hama penyakit yang paling besar di lokasi A yaitu lumut yang tumbuh subur menempel pada *thallus*. Keberadaannya diduga karena kesuburan perairan di kawasan tersebut.

Kesesuaian Lahan

Parameter lingkungan yang sudah diskoring berdasarkan nilai pengukuran di lokasi selanjutnya diolah agar mendapatkan kawasan yang sesuai untuk kegiatan budidaya rumput laut menggunakan bantuan software Arcgis yang dapat dilihat pada (Gambar 1).

Penilaian kesesuaian lahan sebagai indikator penentu dalam pengembangan kegiatan budidaya rumput laut di Kecamatan Bluto yang didasarkan atas beberapa parameter kesesuaian ekologi perairan dan berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian perairan untuk budidaya rumput laut dari masing-masing kategori kesesuaian. Hasil perhitungan lahan sebagai berikut lahan yang sesuai sebanyak 770,19 ha yang terdiri dari S1 (sangat sesuai) seluas 561,69 ha, S2 (sesuai) seluas 208,19 ha, S3 (sesuai bersyarat) 42 ha, dan TS (tidak sesuai) 65,72 ha.

Daya Dukung Perairan

Untuk mengetahui kawasan yang bisa dijadikan pengembangan budidaya rumput laut melalui pendekatan kapasitas perairan, pendekatan kapasitas perairan dipengaruhi oleh luas areal budidaya yang sesuai (sangat sesuai dan sesuai). Daya dukung perairan di Kecamatan Bluto adalah 770,19 ha dan jumlah unit atau rakit yang dapat digunakan dengan luas tersebut adalah 42.788 unit. Menurut data dari Anonim (2012), jumlah petani rumput laut di Kecamatan Bluto sebanyak 900 orang dengan jumlah rakit 13.400 unit dan hasil produksi selama setahun sebesar 98.839,83 ton. Hasil produksi bisa ditingkatkan tanpa harus adanya degradasi lingkungan dengan memperbanyak jumlah rakit. Dengan sisa 29.388 rakit lagi yang bisa ditanam, maka dapat diasumsikan produksi rumput laut bisa bertambah sebesar 315.608,85 ton/tahun.

Hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan di beberapa desa yang terdapat di Kecamatan Bluto menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat membuang limbah baik industri atau rumah tangga dan pertanian langsung ke laut, sehingga berdampak langsung pada pencemaran dan degradasi kualitas perairan. Keberadaan kegiatan perikanan tangkap juga dapat mengganggu kegiatan budidaya rumput laut, dengan semakin banyak masyarakat yang menjadi nelayan maka semakin berkurang lahan budidaya yang tersedia. Konflik-konflik yang ditemukan di lokasi yaitu konflik antara nelayan dengan pembudidaya dan konflik keamanan. Peran serta pemerintah daerah perlu di laksanakan dalam bentuk penanggulangan konflik-konflik yang terjadi. Dari segi pencemaran lingkungan bisa diadakan sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan untuk kepentingan perekonomian bersama. Membagi zona-zona pemanfaatan perairan antara perikanan tangkap dan budidaya karena Kabupaten Sumenep dengan otonomi penuh, mempunyai peluang yang besar untuk memanfaatkan, mengelola dan melindungi wilayah pesisir dan lautannya untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat (Fachrudin, 2011).

PENUTUP

Kegiatan budidaya rumput laut di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dapat menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat pesisir dengan memanfaatkan luas perairan yang berpotensi, akan tetapi harus memperhitungkan aspek lingkungan dan sosial masyarakat seperti konflik kepentingan dan pemanfaatan wilayah dengan perikanan tangkap. Hasil penelitian ini merekomendasikan tentang perlunya campur tangan pemerintah dalam penyelesaian konflik dalam pemanfaatan lahan untuk perikanan tangkap dan budidaya dengan mengatur zona-zona pemanfaatan dan sosialisasi dalam pelestarian lingkungan pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1996. Pengembangan Prototipe Wilayah Pesisir dan Marin Kupang-Nusa Tenggara Timur, Pusat Bina Aplikasi Inderaja dan Sistem Informasi Geografis, Cibinong.
- Anonim, 2002. Modul Sosialisasi dan Orientasi Penataan Ruang, Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, Jakarta.
- Anonim, 2008. Pengembangan Sentra Budidaya dan Agribisnis Rumput Laut. Dinas Kelautan dan Perikanan. Sumenep.
- Anonim, 2012. The State of World Fisheries and Aquaculture. Food and Agriculture Organization of The United Nations. Rome.
- Agustiningsih, D., 2012. Analisis Kualitas Air dan Beban Pencemaran Berdasarkan Penggunaan Lahan di Sungai Blukar Kabupaten Kendal. Tesis Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Amarulah, 2007. Pengelolaan Sumberdaya Perairan Teluk Tamiang Kabupaten Kota Baru untuk Pengembangan Budidaya Rumput Laut (*Eucheuma cottonii*). Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

- Amosu dan Alberto, O. 2012. South African Seaweed Aquaculture: A Sustainable Development Example for Other African Coastal Countries. *African Journal of Agricultural*, 8(43):5268-5279.
- Arisandi. 2011. Pengaruh Salinitas yang Berbeda terhadap Morfologi, Ukuran dan Jumlah Sel, Pertumbuhan serta Rendemen Karaginan *Kappaphycus alvarezii*. *Jurnal Ilmu Kelautan*, 16(3):143-150.
- Ariati, R.W., Sya'rani, L dan Arini, E. 2007. Analisis Kesesuaian Perairan Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan Sebagai Lahan Budidaya Rumput Laut Menggunakan Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Pasir Laut*, 3(1):27-45.
- Aslan, L.M. 1998. *Budidaya Rumput Laut. Edisi Revisi*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Burtin, P. 2003. Nutritional Value of Seaweed. *Journal of Agricultural Food Chemistry*, 2(4):1-6.
- Dahuri, R., 1998. The Application of Carrying Capacity Concept For Sustainable Coastal Resources Development in Indonesia. *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Indonesia*, 1(1):22-31